

DIAMINAVEC®

COMPOSICIÓN	Cada 100 ml de solución inyectable contiene: Oxitetraciclina clorhidrato 7 g (equivalente a 6.49 g de oxitetraciclina base) Diaminazene diaceturato 3.5 g Excipientes c.s.p. 100 ml
ESPECIES DE DESTINO	Bovinos
INDICACIONES	En Bovinos para el tratamiento de <i>Babesia bovis</i>, <i>Babesia bigemina</i> y <i>Anaplasma marginale</i> .
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN	Dosis: 1 ml por cada 10 Kg de peso. Esto equivale a 7 mg/Kg de oxitetraciclina clorhidrato y 3.5 mg/Kg de diminazene diaceturato. Se puede repetir cada 24 horas. Se recomienda una o dos dosis. Vía de administración: Intramuscular.
TIEMPO DE RETIRO	Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento.
PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO	No administrar en animales hipersensibles a alguno de los componentes del producto. No administrar a vacas en gestación. No administrar a vacas en lactancia. No administrar a hembras gestantes. No administrar en animales de menos de un mes de vida. No administrar en insuficiencia renal o hepática. No administrar en animales con antecedentes de trastornos cardiovasculares. No exceder las dosis propuestas. La administración puede ser dolorosa. Puede provocar disminución de la presión sanguínea. Puede ocasionar alteración o calcificación de huesos y dientes. Dosis altas repetidas pueden dar origen a hepatotoxicidad. No mezclar en la misma jeringa, cánula o envase, con cualquier otra sustancia ajena al producto (otros antibióticos, antiinflamatorios, anestésicos). Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Mantener a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.
PRESENTACION	Frascos por 100 mL y 250 mL
REGISTRO ICA	10936 MV