

DICOGAN®

COMPOSICIÓN	Cada mL contiene: Diclofenaco sódico 50 mg Excipientes c.s.p. 1 ml
ESPECIES DE DESTINO	Bovinos, Ovinos, Equinos, Caprinos, y Porcinos
INDICACIONES	En Bovinos, Ovinos, Equinos, Caprinos, y Porcinos como analgésico, antiinflamatorio, en casos agudos por traumatismo músculo esquelético como artritis, osteoartritis, bursitis, tendinitis, tenosinovitis. En tratamiento de procesos de dolor visceral y fiebre, como cólico y traumatismo de órganos internos. Tratamiento de dolor postquirúrgico.
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN	Bovinos y Porcinos: la dosis es de 2.3 mg/Kg de peso vivo, en la práctica 2.3 ml/50 Kg. de peso vivo por vía intramuscular una vez al día durante 3 días. Equinos: la dosis es de 2.3 mg/Kg de peso vivo, en la práctica 2.3 ml/50 Kg. de peso vivo por vía intramuscular o intravenosa una vez al día durante 3 – 5 días. Ovinos y Caprinos: 1 mg/Kg de peso vivo, en la práctica 1 ml/50 Kg de peso vivo, vía intramuscular o intravenosa una vez al día durante 3 – 5 días.
TIEMPO DE RETIRO	Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.
PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO	Administrar máximo por punto de inyección 12 ml en Bovinos, 3 ml en Porcinos, 10 ml en Equinos y 5 ml en Ovinos y Caprinos. No se recomienda su uso durante la gestación. Administrar con precaución en animales con alteraciones cardíacas, hepáticas, renales o trastornos hemorrágicos. No administrar a animales con úlceras gástricas y/o intestinales. No administrar en animales que presenten hipersensibilidad al principio activo. Evitar el uso en animales deshidratados, hipovolémicos e hipotensos. No administrar con otros antiinflamatorios no esteroides, glucocorticoides, fármacos anticoagulantes, aminoglucósidos, o con otras sustancias parcialmente nefrotóxicas. Manténgase fuera del alcance los niños y animales domésticos. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Conservar a una temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.
PRESENTACION	Frascos por 10 ml y 50 ml.
REGISTRO ICA	8300 MV