DIPIRINA®

COMPOSICIÓN	Cada mL contiene: Dipirona 500 mg Excipientes c.s.p. 1 ml
ESPECIES DE DESTINO	Bovinos, Equinos, Porcinos y Perros.
INDICACIONES	Bovinos, Equinos, Porcinos y Perros como analgésico, antipirético y antiespasmódico.
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN	**Bovinos:** 25 mg/Kg de peso vivo, en la práctica 1 ml/20 Kg de peso vivo. **Equinos:** 12-36 mg/Kg de peso vivo, en la práctica 1 ml/30 Kg de peso vivo. **Porcinos y Perros:** 25 mg/Kg de peso vivo, en la práctica 1 ml/20 Kg de peso vivo. Se aplica por vía intramuscular o intravenosa lenta cada 8 horas
TIEMPO DE RETIRO	**La leche producida durante el tratamiento y 2 días después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.**
PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO	Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Conservar a una temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.
PRESENTACION	Frascos por 20 ml y 50 ml.
REGISTRO ICA	**1062 DB**