

DORAGAN®

COMPOSICIÓN	Cada mL contiene: Doramectina 10 mL Excipientes c.s.p. 1 mL
ESPECIES DE DESTINO	Bovinos, Ovinos y Porcinos.
INDICACIONES	Está indicado para el tratamiento y control de parasitosis internas y externas del ganado Bovino, Ovino y Porcino. Bovinos Nemátodos gastrointestinales: <i>Hamonchus placei</i> , <i>Ostertagia ostertagi</i> , <i>Trichostrongylus axei</i> , <i>Bunostomum phlebotomum</i> , <i>Nematodirus spp.</i> , <i>Cooperia oncophora</i> , <i>Cooperia pectinata</i> , <i>Cooperia punctata</i> , <i>Trichostrongylus colubriformis</i> , <i>Oesophagostomum radiatum</i> , <i>Strongyloides papillosus</i> , <i>Trichuris spp.</i> Nemátodos pulmonares: <i>Dyctiocaulus viviparus</i> . Garrapatas: Ayuda en el control de <i>Rhipicephalus (Boophilos) microplus</i> . Larvas productoras de noche: <i>Dermatobia hominis</i> , <i>Hypoderma bovis</i> . Ácaros de la Sarna: <i>Chorioptes bovis</i> , <i>Sarcoptes scabiei</i> , y <i>Psoroptes sp.</i> Piojos: <i>Linognathus vituli</i> , <i>Haematopinus eurytenuis</i> , <i>Solenopotes capillatus</i> . Miasis: Gusaneras – <i>Cochliomya hominivorax</i> . Piojos masticadores como <i>Bovicola bovis</i> y la Mosca de los cuernos <i>Haematobia irritans</i> . Ovinos Nemátodos gastrointestinales: <i>Haemonchus contortus</i> , y <i>Teladorsagia circumcincta</i> , <i>Trychostrongylus axei</i> , <i>Trichostrongylus colubriformis</i> , <i>Trichostrongylus vitrinus</i> , <i>Chabertia spp.</i> , <i>Cooperia oncophora</i> , <i>Nematodirus spp.</i> , <i>Trichuris spp.</i> Nemátodo pulmonar: <i>Dyctiocaulus viviparus</i> . Ácaros: <i>Psoroptes ovis</i> . Miasis (gusaneras): <i>Cochliomyia hominivorax</i> (gusano de la cabeza), <i>Oestrus ovis</i> . Porcinos: Nemátodos gastrointestinales: <i>Hyostrongylus rubidus</i> , <i>Strongyloides ransomi</i> , <i>Ascaris suum</i> , <i>Oesophagostomum dentatum</i> , <i>Trichuris suis</i> . Nemátodo pulmonar: <i>Metastrongylus spp.</i> Nemátodo renal: <i>Stephanurus dentatus</i> . Ácaros de la sarna: <i>Sarcoptes scabiei</i> .
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN	Bovinos y Ovinos: Inyectar por vía subcutánea o intramuscular 200 µg/Kg de peso vivo, en la práctica 1 mL/50 Kg de peso vivo. Porcinos: Inyectar por vía intramuscular 300 µg/Kg de peso vivo, en la práctica 1 mL/33 Kg de peso vivo.
TIEMPO DE RETIRO	Bovinos y Ovinos: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 35 días después de finalizado el tratamiento. Porcinos: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento.

PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz solar. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
PRESENTACION	Frascos por 500 mL
REGISTRO ICA	6851 MV