

FENBENDAZOL 25%

COMPOSICIÓN	Cada 100 mL contienen: Fenbendazol 25 g Excipientes c.s.p. 100 mL
ESPECIES DE DESTINO	Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Equinos y Caninos.
INDICACIONES	Bovinos, Caprinos y Ovinos contra las infecciones ocasionadas por formas inmaduras y adultas de parásitos como: <i>Haemonchus sp.</i> , <i>Ostertagia sp.</i> , <i>Cooperia sp.</i> , <i>Nematodirus sp.</i> , <i>Oesophagostomum dentatum</i> , <i>Strongyloides sp.</i> , <i>Dictyocaulus sp.</i> , <i>Trichostrongylus sp.</i> , <i>Moniezia sp.</i> Caninos para <i>Trichuris sp.</i> , <i>Capillaria sp.</i> , <i>Ascaris sp.</i> Porcinos para <i>Oesophagostomum dentatum</i> , <i>Trichuris sp.</i> Equinos para <i>Strongyloides sp.</i> , <i>Parascaris equorum</i> , <i>Oxyuris equi</i> .
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN	Bovinos, Caprinos y Ovinos: 5 mg/Kg de peso, en la práctica 1 mL/50 Kg de peso vivo. Vía oral. Porcinos: 7.5 mg/Kg de peso vivo, en la práctica administrar 1.5 mL/50 Kg de peso vivo. Vía oral. Equinos: 7.5 mg/Kg de peso vivo, en la práctica administrar 1 mL/33 Kg de peso vivo. Vía oral. Caninos: 50 mg/Kg de peso vivo, en la práctica 1 mL/5 Kg de peso vivo. Para los casos de <i>Ascaris sp.</i> , <i>Trichuris sp.</i> , <i>Capillaria sp.</i> Administrar la dosis indicada cada 24 horas durante 3 días, repetir la administración del producto cada 15 a 21 días. Vía oral.
TIEMPO DE RETIRO	Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 11 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.
PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO	Agítese bien antes de usar. Almacene a una temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz solar. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
PRESENTACION	Jeringas por 12 mL. Frascos por 120 mL, 500 mL y garrafa por 2000 mL.
REGISTRO ICA	6398 MV