

GLUCONATO DE CALCIO

COMPOSICIÓN	Cada mL contiene: Gluconato de Calcio 200 mg Excipientes c.s.p. 1 ml
ESPECIES DE DESTINO	Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos y Caninos.
INDICACIONES	Se recomienda en Hipocalcemias, Fiebre de leche, Eclampsia puerperal, y como coadyuvante en el tratamiento de Raquitismo y Osteomalacia en Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos y Caninos.
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN	La dosis es de 1 ml/Kg de peso vivo. Bovinos y Equinos: 300 ml/300 Kg de peso vivo. Terneros y Potros: 100 ml/100 Kg de peso vivo. Ovinos y Porcinos: 50 ml/50Kg de peso vivo. Caninos: 10 ml/10Kg de peso vivo. Por requerirse volúmenes grandes en su dosificación, es preferible usar la vía intravenosa lenta. La vía intramuscular y subcutánea puede ser usada cuando se trate de dosis menores a 50 ml. La frecuencia del tratamiento depende del criterio del Médico Veterinario.
PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO	Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Conservar a una temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
PRESENTACION	Frascos por 250 ml y 500 ml.
REGISTRO ICA	504 DB