

## IVERMECTINA 1%

<b>COMPOSICIÓN</b>	Cada mL contiene: Ivermectina                    10 mg Excipientes c.s.p.            1 mL
<b>ESPECIES DE DESTINO</b>	Bovinos y Porcinos
<b>INDICACIONES</b>	<p>En Bovinos y Porcinos a partir de los 4 meses de edad, para el control y tratamiento del parasitismo gastrointestinal, pulmonar y parásitos externos.</p> <p><b>Bovinos: Endoparásitos:</b> <i>Ostertagia sp., Haemonchus sp., Mecistocirrus digitatus, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia sp., Bunostomum phlebotomum, Nemaatodirus sp. Strongyloides papillosus, Toxocara vitulorum, Parafilaria bovicola, Thelazia sp., Oesophagostomum radiatum. Parásitos pulmonares: Dictyocaulus viviparus. Ectoparásitos: Lignonathus vituli, Solenopotes capillatus, Haematopinus eurytternus, Psoroptes communis var bovis, Sarcoptes scabiei bovis, Chorioptes bovis, Dermatobia hominis. Ayuda en el control de la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus.</i></p> <p><b>Porcinos: Endoparásitos:</b> <i>Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi, Oesophagostomum sp., Trichuris suis, Stephanurus dentatus. Pulmonar: Metastrongylus sp. Ectoparásitos: Haematopinus suis y Sarcoptes scabiei var suis.</i></p>
<b>DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN</b>	<p><b>Bovinos:</b> 1 mL/50 Kg de peso vivo. <b>Porcinos:</b> 1 mL/33 Kg de peso vivo. Se administra únicamente por vía subcutánea.</p>
<b>TIEMPO DE RETIRO</b>	<b>Los Bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. Los Porcinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento. No administrar en vacas en producción de leche destinada al consumo humano, ni 28 días antes del parto.</b>
<b>PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO</b>	<p>No debe aplicarse por vía intramuscular o intravenosa. No aplicar en animales lactantes. No aplicar en animales gestantes próximas a la parición. No usar en animales menores de 4 meses de edad. No aplicar en animales con fiebre o estado de desnutrición grave.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.</p> <p>Almacena a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz solar.</p>
<b>PRESENTACION</b>	Frascos por 50 mL, 250 mL y 500 mL.
<b>REGISTRO ICA</b>	<b>3907 DB</b>