

IVERQUINOS®

| | |
|--------------------------------------|--|
| COMPOSICIÓN | <p>Cada 1 gramo de suspensión contiene:</p> <p>Ivermectina 18.7 gramos Excipientes c.s.p. 1 gramo</p> |
| ESPECIES DE DESTINO | Equinos |
| INDICACIONES | <p>Parásitos internos: gastrófilos y estados arteriales de <i>Strongylus vulgaris</i>, además controla <i>S. equinus</i>, y <i>S. edentatus</i>, <i>Triodontophorus sp.</i> Pequeños estróngilos: (<i>Cyathostomum</i>, <i>Cylicocyclus sp.</i>, <i>Gyalocephalus sp.</i>, <i>Cylicodontophorus sp.</i>, y <i>Cylicostephanus sp.</i>), <i>Oxyuris equi</i>, <i>Parascaris equorum</i>, <i>Trichostrongylus axei</i>, <i>Strongyloides westeri</i>, <i>Habronema muscae</i>. Céstodos: <i>Anoplocephala perfoliata</i>, <i>Anoplocephala magna</i>, <i>Equina mamillana</i>, <i>Dipylidium sp.</i> <i>Taenia hydatigena</i>, <i>Taenia taeniaformis</i>, <i>Taenia pisiformis</i>, <i>Echinococcus granulosus</i>. Parásitos externos: <i>Microfilarias de Onchocerca sp.</i>, y larvas de <i>Habronema sp.</i>, y <i>Draschia sp.</i></p> |
| DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN | <p>El contenido de la jeringa de 6.42 gramos permite tratar un equino de 600 Kg. de peso.</p> <p>Administración vía oral: Administrar el producto en la parte posterior y encima de la lengua, levantando la cabeza del caballo durante unos segundos mientras pasa o deglute el producto.</p> <p>La frecuencia del tratamiento depende del Medico Veterinario.</p> |
| TIEMPO DE RETIRO | Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento. |
| PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO | <p>No tratar yeguas en gestación. No administrar a animales menores de 6 semanas, ni a aquellos severamente debilitados. Agítese antes de usar</p> <p>Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.</p> <p>Mantener a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.</p> |
| PRESENTACION | Jeringa por 6.42 g. |
| REGISTRO ICA | 6425 MV |