

LOMBIFAR®

COMPOSICIÓN	Cada 100 mL de suspensión contiene: Fenbendazol micronizado 6 gramos Triclabendazol micronizado 12 gramos Excipientes c.s.p. 1 gramo
ESPECIES DE DESTINO	Bovinos, Ovinos y Caprinos.
INDICACIONES	En Bovinos, Ovinos y Caprinos para el control y tratamiento de parásitos gastrointestinales, pulmonares y hepáticos tales como: <i>Haemonchus sp.</i> , <i>Ostertagia sp.</i> , <i>Trichostrongylus sp.</i> , <i>Nematodirus sp.</i> , <i>Bunostomum sp.</i> , <i>Trichuris sp.</i> , <i>Oesophagostomum sp.</i> , <i>Strongyloides sp.</i> , <i>Chabertia sp.</i> , <i>Dictyocaulus sp.</i> , <i>Moniezia sp.</i> Y <i>Fasciola hepática</i> .
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN	Por vía oral suministrar 1 mL por cada 10 Kg. de peso vivo, en la práctica 10 mL/100 Kg de peso vivo, esto corresponde a una dosis de Fenbendazol de 6 mg/Kg. y 12 mg/Kg de Triclabendazol.
TIEMPO DE RETIRO	Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 28 días después de finalizado el mismo no debe destinarse para consumo humano.
PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO	Agitar el producto antes de administrarlo. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Mantener a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.
PRESENTACION	Frascos por 120 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 mL.
REGISTRO ICA	8813 MV