

TRATORIL®

COMPOSICIÓN	<p>Cada 1 mL de suspensión contiene:</p> <p>Toltrazuril 50 mg Excipientes c.s.p. 1 mL</p>
ESPECIES DE DESTINO	Bovinos, Porcinos, Perros y Gatos.
INDICACIONES	<p>Para el control y tratamiento de coccidiosis ocasionadas por: En Bovinos: <i>Eimeria bovis</i>, <i>Eimeria zuernii</i>, y <i>Eimeria alabamensis</i>. En Porcinos: <i>Cystoisospora suis</i>. En Perros: <i>Cystoisospora ohioensis</i>, <i>Cystoisospora canis</i>, <i>Cystoisospora burrowsi</i>, y <i>Hepatozoon canis</i>. En Gatos: <i>Cystoisospora felis</i> e <i>Isospora rivolta</i>.</p>
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN	<p>Bovinos: Dosis única oral de 15 mg/Kg de peso vivo, lo que equivale a una dosis práctica de 3 mL/10 Kg de peso vivo.</p> <p>Porcinos: Deben ser tratados en el día 3 a 5 de vida, con un a dosis única oral de 20 mg/Kg de peso vivo, lo que equivale a una dosis práctica de 0.4 mL/Kg. de peso vivo.</p> <p>Gatos: 10 – 20 mg/Kg de peso vivo como dosis única oral, equivalente a 0.2 a 0.4 mL/Kg. de peso vivo.</p> <p>Perros: Para el tratamiento de <i>Isospora</i> de 10 a 20 mg/Kg. de peso vivo como dosis única oral, lo que equivale a una dosis práctica de 0.2 a 0.4 mL/Kg. de peso vivo. En Perros positivos para <i>Hepatozoon canis</i> se debe administrar una dosis de 14 mg/Kg de peso vivo, equivalente a una dosis práctica de 0.28 mL/Kg. de peso vivo cada 24 horas durante 1 a 7 días o a criterio del Medico Veterinario.</p> <p>El tratamiento y administración deben ser precedidos por un diagnóstico clínico. La repetición de este tratamiento depende del criterio de Medico Veterinario y la evolución del cuadro clínico.</p>
TIEMPO DE RETIRO	Los bovinos y porcinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 77 días después de finalizado el tratamiento. No se permite su uso en animales productores de leche para consumo humano.
PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO	<p>Los tratamientos durante los periodos de la enfermedad pueden ser limitados para el lechón debido al daño ya ocurrido en el intestino delgado. Para tener un beneficio mayor los animales deben ser tratados antes de presentar los signos clínicos. Agitar el producto antes de administrarlo.</p> <p>Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.</p> <p>Mantener a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.</p>
PRESENTACION	Frascos por 120 mL, 240 mL, 500 mL y 1000 mL.
REGISTRO ICA	9292 MV